SCHEDA CULTIVAR "BIANCONE"

Sinonimi:
E' stato erroneamente confuso con altri vitigni e da alcuni ritenuto impropriamente una sottovarietà di "Trebbiano" o identico allo "Chasselas Napoléon". Da accertamenti fatti risulta che si tratta di un vitigno molto diverso.

Descrizione Ampelografica
Tralcio erbaceo: di sezione trasversale circolare, contorno in genere angoloso ma talvolta costoluto, lievemente aracnoideo con tomento parzialmente diffuso, di color verde bronzato da un lato.
Viticci: bifidi, lunghi, grossi, intermittenti.
Infiorescenza: (16-22 cm) medio-grossa, semi-spargola.
Fiore: tipo morfologico a sessualità apparente ermafrodita, regolare; bottone fiorale: cilindroide, mezzano, con corolla di colore verde.
Foglia: pentagonale, medio-grande, in genere quinquelobata ma talvolta anche trilobata, con seno peziolare a lira; seni laterali superiori a lira chiusa, seni laterali inferiori a lira.
Portamento della vegetazione: espanso.
Acino erbaceo: ovaleggiante di colore verde scuro, abbastanza pruinoso.
Grappolo a maturità industriale: grosso (lunghezza 18-24 cm) di aspetto più o meno compatto, piramidale, tozzo con una o due ali, peduncolo visibile, semi-legnoso, grosso.
Acino: grosso (diametro trasversale 18 mm), discoide, ma spesso sferoide; ombelico persistente; buccia pruinosa di colore verde giallastro, di medio spessore; polpa succosa con succo incolore di sapore in genere neutro ma qualche volta erbaceo; pedicelli di media lunghezza; cercine evidente, verde; pennello medio; separazione del pedicello dall'acino piuttosto difficile.

Fenologia
Germogliamento: tardivo, circa come il "Trebbiano".
Fioritura: avviene alla metà di Maggio circa e nella prima decade di Giugno nella collezione ampelografica.
Invaiatura: ultima decade d'Agosto
Maturazione dell'uva: seconda-ultima decade di Settembre.
Caduta delle foglie: alla fine di Novembre.

Caratteristiche ed Attitudini colturali
Produzione: abbondante e costante nel clone di cui ci si occupa.
Posizione del primo germoglio fruttifero: 2-3nodo.
Numero medio di infiorescenze per germoglio: 1-2.
Resistenza alle malattie: ai comuni parassiti della vite presenta una resistenza normale.